

Herkenning van marterachtigen



Wezel

Klein, kopromp 15-20 cm (formaat rat), korte staart
Rug roodbruin, buik (room)wit, in winter meer grijs- tot
geelbruin, bruine vlekjes op de hals
Lijn tussen rug en buik meestal grillig,

Hermelijn

Iets groter, kopromp 22-30 cm, lange staart
Rug roodbruin, buik wit tot geel. In winter geheel of gedeeltelijk
wit. Zwarte staartpunt.
Lijn tussen rug en buik recht. Geen halsvlekjes.

Bunzing

Kopromp 30-47 cm, staart 9-19 cm
Donker gekleurd met doorschinerende lichte ondervacht. Wit-
gelige koptekening (gezichtsmasker), oren met lichte rand. (NB
Lichtgekleurde exemplaren kunnen ontsnapte Fretten zijn.
Deze zijn wat kleiner en slanker.)

Amerikaanse nerts

Even groot als bunzing. Egaal gekleurd, meestal donker. Witte
kinvlek. Soms witte vlekjes op borst. Uit fokkerij ontsnapte
exemplaren worden soms aangetroffen.

Steenmarter

Kopromp: 37-52 cm, staart lang 20-30 cm
Grijsbruin, witte keelvlek met uitlopers naar voorpoten. Witte
ondervacht. Snuit lichter dan poten

Boomarter

Even groot als steenmarter. Staartlengte ca. helft
kopromplengte.
Kastanjebruin, roomkleurige keelvlek.
Ondervacht geelbruin tot grijs.

Otter

Groot, kopromp 50-100 cm, staart helft kopromplengte.
Staart gaat geleidelijk over in lichaam.
Zwemvliezen tussen tenen.
Platte kop.
Let op: Wordt soms verward met Bever.

